



虔脩感應丸

強心薬

第2類医薬品

2013年5月改訂(記載要領変更に伴う改訂)
 この添付文書をお読みください。
 主治の症候を詳しく説明する目的に記述してあります。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください

他の強心薬

🗨 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - ① 医師の治療を受けている人
 - ② 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - ③ 次の症状のある人 ぼけしい、下痢、高熱
- 5～6日間(消化不良、胃腸虚弱、小児五疳に服用する場合には1ヵ月位)服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

動悸、息切れ、気付け、下痢、消化不良、胃腸虚弱、ひきつけ、小児五疳、夜なき



用法・用量

次の量を1日1回水又は白湯にて服用してください

成人(15歳以上)……………1回1個

8歳以上15歳未満……………1回1/2個

● 8歳未満は服用しないでください

〈用法・用量に関する注意〉

(1)用法・用量を厳守してください

(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください

(3)薬剤の取り出し方

右図のように薬剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押し、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください

(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります)

〈PTPシートの取り出し図〉



成分・分量 1日量(1個)中

ジャコウ……………4mg ゴオウ……………5mg

ニンジン……………80mg ガジュツ……………49mg

サフラン……………10mg ジンコウ……………30mg

胆黄1号……………5mg(牛胆汁83.3mgの抽出成分)

ネオプラーゼ……………35mg(牛胆汁100mgの脱脂成分)

d-ボルネオール……………5mg

添加物として、パラベン、安息香酸Na、寒梅粉、香料、トメントール、全蛋、セラック、リン酸水素Ca水和物を含有する

〈保管及び取扱い上の注意〉

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4)使用期限の過ぎた製品は服用しないでください

製造販売元 株式会社 廣 昌 堂

富山市梅沢町2丁目9-1

(お問い合わせ先)

株式会社 廣昌堂「お客様相談窓口」

電話番号：076-424-2259

受付時間：9時から17時まで(土・日・祝祭日を除く)

副作用救済制度 ☎ 0120-149-931

